

Rafael Gosalbez, M.D., FAAP
Andrew Labbie, M.D., FAAP
Kristin Kozakowski, M.D.
Miguel Castellan, M.D.

Email:
rafaelgosalbez@hotmail.com
andrew.labbie@mch.com
kristin.kozakowski@mch.com
miguel.castell@gmail.com

Kevin Olson, PA-C
Rigoberto Acosta, PA-C
Juddie M. Munar, ARNP
Natalie Hunter, ARNP

Email:
kevin.olson@mch.com
rigoberto.acosta@mch.com
arnp.juddiemunar@yahoo.com
arnp.nataliehunter@gmail.com

Circuncisión: Cuidado y Problemas

Definición

La circuncisión es la extirpación del prepucio normal en los varones. Los primeros días la incisión se torna roja y puede ser dolorosa al tacto y la presión, pero para el tercer día el dolor es mínimo. La escara o costra en la línea de incisión se desprende después de 7 a 10 días. Si se utilizó el anillo llamado Plastibell, éste se desprenderá entre los 8 y 14 días y usted no debe quitarlo porque podría provocar sangramiento. En los recién nacidos cualquier herida o costra en la cabeza del pene puede tomar un color amarillento que puede confundirse con infección o pus y que es debido al aumento de la bilirrubina en la sangre del bebé causada por el íctero fisiológico que es un proceso normal.

Cuidados en Casa

- 1. Anillo tipo Plastibell:** Limpie suavemente la región con agua un mínimo de tres veces al día o cada vez que se ensucie o cambie el pañal. Generalmente no es necesario usar jabón. Seque mediante suaves golpecitos sin arrastrar para evitar aflojar accidentalmente el anillo. Después aplique pomada triple-antibiótica, Neosporín o Bacitracín en el área quirúrgica y la cabeza del pene para mantenerlos suaves y sanos durante el proceso de cicatrización.
- 2. Sin anillo Plastibell:** Los cuidados son iguales que con el anillo Plastibell con la diferencia de que la herida está cubierta con una venda que se debe dejar intacta que debe caer por sí sola. Aplique pomada Triple-Antibiótica sobre la venda en contra del sentido de las agujas del reloj cada vez que cambie el pañal para mantener el área suave. No sumerja al niño en agua al bañarlo las primeras 48 horas; después lo baña normalmente sumergiendo en el agua su pene para que la venda se afloje y caiga.

Llame al médico INMEDIATAMENTE si en los primeros días nota que:

- La orina sale a gotas.
- La cabeza del pene se torna azul o negra.
- Si ve coágulos o gotas de sangre mayores que una moneda de 25 centavos en el pañal.
- La cabeza del pene se pasa completamente a través del plastibell.
- El bebé tiene fiebre.
- El bebé parece estar enfermo.

Llame al médico en horas de oficina si:

- A usted le parece que el aspecto de la circuncisión no es normal.
- El anillo Plastibell no se ha caído después de los 14 días.
- Usted tiene otras preguntas o inquietudes.

Miami Office – Miami Children's Hospital ● Medical Arts Building ● 3200 S.W. 60 Court ● Suite 104 ● Miami, Florida 33155 305-669-6448

Pembroke Pines Office – Professional Centre at Pembroke Lakes Mall ● 700 N. Hiatus Road ● Suite 216

Pembroke Pines, Florida 33026 Tel: 954-433-5300 ● Fax: 954-433-5340

Boca Raton Office – West Boca Medical Office Building ● 9980 Central Park Blvd. N. ● Suite 302 Boca Raton, FL 33428

Boca Raton Tel: 561-483-0332 ● Fax: 561-483-5530

Business Office – 3200 S.W. 60 Court ● Suite 104 ● Miami, Florida 33155 ● Tel:305-669-6448 ● Fax:305-663-8485
Miami Office – Miami Children’s Hospital ● Medical Arts Building ● 3200 S.W. 60 Court ● Suite 104 ● Miami, Florida 33155
Pembroke Pines Office – Professional Centre at Pembroke Lakes Mall ● 700 N. Hiatus Road ● Suite 216
Pembroke Pines, Florida 33026 Tel: 954-433-5300 ● Fax: 954-433-5340
Boca Raton Office – West Boca Medical Office Building ● 9980 Central Park Blvd. N. ● Suite 302 Boca Raton, Fl 33428
Boca Raton Tel: 561-483-0332 ● Fax: 561-483-5530