

Rafael Gosalbez, M.D., FAAP
Andrew Labbie, M.D., FAAP
Kristin Kozakowski, M.D.
Miguel Castellan, M.D.

Email:

rafaelgosalbez@hotmail.com kevin.olson@mch.com

andrew.labbie@mch.com

kristin.kozakowski@mch.com

miguel.castell@gmail.com

arnp.nataliehunter@gmail.com

Kevin Olson, PA-C
Rigoberto Acosta, PA-C
Juddie M. Munar, ARNP
Natalie Hunter, ARNP

Email:

rigoberto.acosta@mch.com

arnp.juddiemunar@yahoo.com

Después del procedimiento:

Al darles de alta del hospital, una prescripción de analgésico se les proveerá (usualmente Acetaminofén con Codeina), la cual se deberá de administrar al paciente durante los primeros 1-2 días, sólo cuando sea necesario. Después de este periodo, puede utilizar acetaminofén regular para tratar el malestar, ya que el acetaminofén con codeina puede causar estreñimiento. Además, una prescripción para antibióticos y un antiespasmódico de la vejiga (oxybutirin/Ditropan) se le dará. El oxybutirin puede causar rubor facial (enrojecimiento) 30 minutos después que se tome. Este es un efecto secundario esperado y no una reacción alérgica.

Después de la anestesia, se puede esperar que el paciente tenga rubor facial (enrojecimiento). Esto se resolverá por sí solo. La anestesia también puede causar estreñimiento por los primeros 2-3 días. Puede utilizar supositorios de glicerina (sin necesidad de prescripción), al igual que jugo de pera o de ciruela para tratar el estreñimiento. Fiebre, aunque es inusual, puede ocurrir durante las primeras 24 horas

Surgical site care:

Su niño tendrá un vendaje grande al igual que una pequeña sonda para la orina después de la cirugía. Es de esperar que el vendaje se ensucie a medida que pasen los días, pero es muy importante mantenerla lo más limpia y seca posible. En el caso de infantes y niños pequeños, se les recomienda que usen doble pañal para asegurarse de que el vendaje se mantenga seco.

También es normal ver una mínima cantidad de sangre en el vendaje.

Es de suma importancia asegurarse que la sonda este drenando apropiadamente y que no este bloqueada. Es posible expulsar pequeños coagulos de sangre por medio de la sonda, lo cual es normal ya que la vejiga está irritada. Ambos, el vendaje y la sonda, serán removidos bajo el criterio del cirujano durante las citas de control. Los puntos se reabsorben solos, no hay necesidad de removerlos.

Las restricciones de actividad son las siguientes:

Evite actividades y deportes extremos (ej. Montar bicicleta, a caballo, artes marciales, jugar football, etc.) hasta su primer control en la oficina.

Llame al doctor si:

- Nota sangramiento que empape el bendaje.
 - La sonda no drena apropiadamente.
 - La sonda se sale o el bendaje se cae.
 - Su hijo tiene dolor severo.
 - Fiebre alta (101.5 F/38.6 C)