

Rafael Gosalbez, M.D., FAAP
Andrew Labbie, M.D., FAAP
Kristin Kozakowski, M.D.
Miguel Castellan, M.D.

Email:
rafaelgosalbez@hotmail.com
andrew.labbie@mch.com
kristin.kozakowski@mch.com
miguel.castell@gmail.com

Kevin Olson, PA-C
Rigoberto Acosta, PA-C
Juddie M. Munar, ARNP
Natalie Hunter, ARNP

Email:
kevin.olson@mch.com
rigoberto.acosta@mch.com
arnp.juddiemunar@yahoo.com
arnp.nataliehunter@gmail.com

Definición:

La reparación de testículo no descendido (Orquiopexia) es una cirugía para corregir los testículos que no han bajado a su lugar correcto en el escroto.

Después

del procedimiento:

Al darles de alta del hospital, una prescripción de analgésico se les proveerá (usualmente acetaminofén con codeína). Deberá de darle esta medicina al paciente durante los primeros 1-2 días, sólo cuando sea necesario. Después de este periodo, puede utilizar acetaminofén regular para tratar el malestar, ya que el acetaminofén con codeína puede causar estreñimiento.

Después de la anestesia, se puede esperar que el paciente tenga rubor facial (enrojecimiento). Esto se resolverá por sí solo. La anestesia también puede causar estreñimiento por los primeros 2-3 días. Puede utilizar supositorios de glicerina (sin necesidad de prescripción), al igual que jugo de pera o de ciruela para tratar el estreñimiento. Fiebre, aunque es inusual, puede ocurrir durante las primeras 24 horas.

Surgical site care:

"Steristrips" (curitas quirúrgicas) se utilizan para mantener cerrada la herida. Estas se caeran durante 2 a 3 semanas después de la cirugía. El tomar baños regulares facilita que se caigan. No es necesario remover los "steristrips".

Los puntos se reabsorben solos. Tampoco hay necesidad de remover los puntos.

En algunos casos, un botón plástico se adhiere al escroto para sostener el testículo en su lugar. Este botón usualmente se cae durante las 2 primeras semanas post-operatorias. Si no se ha caído, éste se removerá durante la primera visita de control (usualmente 2 semanas después de la cirugía).

Baños de esponja se recomiendan durante los primeros 2 días después de la cirugía para evitar infección. Evite sumergir en agua al paciente durante este periodo. El paciente se puede bañar después de estos 2 días.

Things to expect after the procedure:

- ① Mild swelling around the incision
- ① Minimal bruising
- ① A non-tender, firm mass *beneath the incision*
- ① A non-tender, firm testicle

Las restricciones de actividad son las siguientes:

Evite actividades y deportes extremos (ej. Montar bicicleta, a caballo, artes marciales, jugar football, etc.) hasta su primer control en la oficina.

Llame al doctor si:

- Nota sangramiento de igual o mayor tamaño que una moneda de 25 centavos.

El paciente sufre de dolor severo.

- Fever above 101°F, 24 hours after surgery

Business Office – 3200 S.W. 60 Court ● Suite 104 ● Miami, Florida 33155 ● Tel:305-669-6448 ● Fax:305-663-8485

Miami Office – Miami Children’s Hospital ● Medical Arts Building ● 3200 S.W. 60 Court ● Suite 104 ● Miami, Florida 33155

Pembroke Pines Office – Professional Centre at Pembroke Lakes Mall ● 700 N. Hiatus Road ● Suite 216

Pembroke Pines, Florida 33026 Tel: 954-433-5300 ● Fax: 954-433-5340

Boca Raton Office – West Boca Medical Office Building ● 9980 Central Park Blvd. N. ● Suite 302 Boca Raton, FL 33428

Boca Raton Tel: 561-483-0332 ● Fax: 561-483-5530